

Data 26 NOV. 2021 Prot. 555885 Class.: *ad* Prat. Fasc. Allegati n. 1

Oggetto: raccomandazione per la prosecuzione delle campagne vaccinali anti COVID-19 e anti-influenzale

Ai  
Direttori Generali  
Direttori Sanitari  
**Aziende ULSS**

E, p.c. Assessore alla Sanità - Servizi Sociali –  
Programmazione Socio Sanitaria  
Direttore Direzione Prevenzione, Sicurezza  
alimentare, Veterinaria  
Direttore Direzione Programmazione Sanitaria  
Direttore Generale Azienda Zero

**LORO SEDI**

Si evidenzia la necessità di procedere rapidamente nella campagna vaccinale anti COVID-19, sia per quanto riguarda le dosi booster, sia per quanto riguarda la somministrazione di prime dosi, entrambe azioni essenziali per contrastare l'incremento di contagi, ricoveri e decessi. Allo stesso tempo, è necessario proseguire con la campagna vaccinale anti-influenzale per la stagione in corso.

Al fine di procedere con entrambe le campagne, è importante ribadire che, come previsto dalla Circolari del Ministero della Salute n. 44591 del 2.10.2021 e n. 53312 del 22.11.2021, i due vaccini possono essere co-somministrati nella stessa seduta. Tale raccomandazione risulta infatti in linea con le indicazioni delle buone pratiche vaccinali che ribadiscono come è sempre opportuno non rimandare, quando non necessario, una vaccinazione per garantire immediatamente la protezione nei confronti di una malattia in particolare per i soggetti a maggior rischio di forme gravi (es. soggetti anziani).

Si rappresenta che, in assenza di specifiche controindicazioni è quindi opportuno proporre all'interessato la co-somministrazione di entrambe le vaccinazioni. Nel caso in cui la co-somministrazione non fosse possibile a seguito di valutazione medica o per rifiuto del soggetto, è opportuno procedere subito alla vaccinazione anti-COVID e programmare nell'immediatezza la somministrazione del vaccino anti-influenzale.

A partire dal 2 novembre u.s. alla campagna vaccinale anti-COVID-19 si è affiancata la somministrazione del vaccino anti-influenzale, in cui sono coinvolti principalmente i Medici di Medicina Generale. Dal monitoraggio condotto si registra già in questa fase una buona adesione che ha portato in pochi giorni alla somministrazione di oltre 300.000 dosi.

**Area Sanità e Sociale**

Palazzo Molin – S. Polo, 2513 – 30123 Venezia – tel. 041/2793455-1411-1473  
e-mail: [area.sanitasociale@regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@regione.veneto.it) - pec.: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)

Fatturazione elettronica – Codice Univoco Ufficio 95VBT1



Al fine di favorire la diffusione delle informazioni è stata predisposta un' informativa (Allegato 1) che può essere diffusa ai Medici di Medicina Generale in considerazione del loro ruolo e contributo nella prosecuzione di entrambe le campagne di vaccinazione.

Si raccomanda che le Aziende ULSS prevedano e rafforzino il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale nell'offerta vaccinale anti COVID-19, al fine di promuovere l'adesione consapevole di chi non ha già aderito e di completare tempestivamente la protezione, in particolare dei soggetti più fragili, con la somministrazione della dose booster, anche in considerazione delle recenti aperture a ulteriori gruppi target.

Ringraziando della collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale  
Area Sanità e Sociale  
Dr. Luciano Flor

*Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria  
Direttore: Dr.ssa Francesca Russo  
Referente istruttoria: Dott. Michele Mongillo*

**Area Sanità e Sociale**

Palazzo Molin – S. Polo, 2513 – 30123 Venezia – tel. 041/2793455-1411-1473  
e-mail: [area.sanitasociale@regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@regione.veneto.it) - pec.: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)

Fatturazione elettronica – Codice Univoco Ufficio 95VBT1



# Dosi booster: il ruolo del Medico di Medicina Generale

## E' POSSIBILE PORRE UN FRENO ALLA DIFFUSIONE DEI CONTAGI RAFFORZANDO LA CAMPAGNA VACCINALE ANTI COVID-19. NON RIMANDARE LA SOMMINISTRAZIONE DELLA DOSE BOOSTER

La copertura immunitaria del ciclo vaccinale primario diminuisce con il passare dei mesi. Le evidenze scientifiche provenienti dai dati inglesi ed israeliani dimostrano come la somministrazione di dosi booster stia garantendo un incremento della protezione contro l'infezione, prevenendo le forme più gravi di malattia [1]. **Mettere in sicurezza i cittadini con la terza dose è oggi una priorità.**

Gruppo	Fascia di età	Tasso (per 100.000)			Rischio Relativo	
		Non vaccinati	Vaccinati con ciclo completo entro 6 mesi	Vaccinati con ciclo completo da >6 mesi	Non vaccinati rispetto a vaccinati con ciclo completo entro 6 mesi	Non vaccinati rispetto a vaccinati con ciclo completo da >6 mesi
Diagnosi di Sars-CoV-2 (01/10/2021-31/10/2021)	12-39	676,9	138,9	339,2	4,9	2,0
	40-59	649,6	174,6	331,1	3,7	2,0
	60-79	531,6	151,8	301,4	3,5	1,8
	80+	676,7	138,6	199,9	4,9	3,4
Ospedalizzazioni (01/10/2021-31/10/2021)	12-39	13,1	0,8	3,2	16,4	4,1
	40-59	34	1,9	5,4	17,9	6,3
	60-79	89,6	8,9	19	10,1	4,7
	80+	218,6	30,4	37,1	7,2	5,9
Ricoveri in Terapia Intensiva (24/09/2021-24/10/2021)	12-39	0,7	0	0	-	-
	40-59	4,1	0,1	0,1	41,0	41,0
	60-79	18,5	1	2	18,5	9,3
	80+	12,9	1,8	1,9	7,2	6,8
Decessi (10/09/2021-10/10/2021)	12-39	0,1	0	0	-	-
	40-59	1,3	0,1	0,2	13,0	6,5
	60-79	12,3	0,7	2,1	17,6	5,9
	80+	64,9	7,1	10,6	9,1	6,1


Report Epidemiologico ISS [www.iss.it/sorveglianze-covid-19](http://www.iss.it/sorveglianze-covid-19)

## CONTRASTARE LA DISINFORMAZIONE

È ampiamente documentato come il Medico di Medicina Generale rivesta un ruolo fondamentale nella campagna vaccinale, rappresentando una delle fonti di informazione più affidabile e autorevole a cui il cittadino può affidarsi [2]. Fornire informazioni esaustive, correggendo i messaggi errati circolanti in quella quota di popolazione esitante, ma non per questo "no-vax", permette di **promuovere un'adesione consapevole alla vaccinazione.**

## SOMMINISTRARE LA DOSE BOOSTER E IL VACCINO ANTI-INFLUENZALE NELLA STESSA SEDUTA

In assenza di specifiche controindicazioni è opportuno proporre all'interessato la **co-somministrazione di entrambe le vaccinazioni**. Nel caso in cui la co-somministrazione non fosse possibile, a seguito di valutazione medica o per rifiuto del soggetto, è opportuno **procedere subito alla vaccinazione anti-COVID** e programmare nell'immediatezza (a qualsiasi intervallo di tempo, come da indicazione AIFA) la somministrazione del vaccino anti-influenzale. È importante non rimandare, quando non necessario, una vaccinazione per garantire immediatamente la protezione in particolare per i soggetti a maggior rischio di forme gravi (es. soggetti anziani). Per approfondimenti [www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19\\_17-novembre-2021.pdf](http://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_17-novembre-2021.pdf)



**OLTRE 300.000 DOSI DI VACCINO ANTI-INFLUENZALE SOMMINISTRATE IN POCHI GIORNI. E' FONDAMENTALE PROCEDERE PARALLELAMENTE CON LE DUE CAMPAGNE VACCINALI, SENZA RIMANDARE O POSTICIPARE L'OFFERTA VACCINALE COVID-19**

Trend vaccinazioni antinfluenzale somministrate in Veneto da MMG. Focus dati ottobre-novembre 2021 [3].